

Mifepristona y Misoprostol

HOJA INFORMATIVA PARA PACIENTES

PASO 1: Mifepristona

Trague 1 pastilla cuando esté lista.

Pastilla tomada el ____ / ____ / ____ a las ____ : ____ A.M. / P.M.



PASO 2: Misoprostol


Tome estas pastillas entre 24 y 48 horas después del PASO 1.

Ponga 2 pastillas dentro de cada mejilla (4 pastillas en total).

Espere 30 minutos para que las pastillas se disuelvan.

Luego, haga buches con agua y trague.

Tome las pastillas el ____ / ____ / ____ a las ____ : ____ A.M. / P.M.



¿Qué debería esperar?

- El sangrado y los cólicos comenzarán dentro de unas pocas horas después de seguir el **PASO 2**. Normalmente, esto significa que el medicamento está funcionando para expulsar el embarazo.
- El sangrado y los cólicos serán más intensos que los de su período habitual. Es posible que observe coágulos de sangre y tejido a medida que el embarazo es expulsado del útero.
- El sangrado puede comenzar después de seguir el **PASO 1** y antes de seguir el **PASO 2**.
- La mayoría de las personas expulsan el embarazo entre las 2 y las 24 horas después de seguir el **PASO 2**.
- Puede presentar náuseas, dolor de cabeza, diarrea, mareos, fiebre o escalofríos.
- No tome más pastillas para el dolor de las que le haya recomendado su médico. Puede tomar un medicamento de venta libre para la diarrea, si lo necesita.

¿Qué más debería saber?

- Estos medicamentos hacen efecto en cuestión de horas, así que se debe preparar para los calambres y el sangrado con toallas sanitarias.
- Es mejor tomar estos medicamentos cuando disponga de un par de días para quedarse en casa y descansar.
- El sangrado vaginal es normal durante 9 a 16 días después de usar estos medicamentos. Algunas personas experimentan sangrados ligeros hasta por 30 días.

Asegúrese de realizar un seguimiento con su médico entre 7 y 14 días después del **PASO 1**. Su médico se asegurará de que se sienta bien y de que el embarazo haya sido expulsado del útero. Si el embarazo no ha sido expulsado, su médico le hablará acerca de un procedimiento quirúrgico para interrumpir el embarazo.

Mifepristona y Misoprostol

HOJA INFORMATIVA PARA PACIENTES

¿Cómo funcionan estos medicamentos?

La mifepristona bloquea una hormona que es necesaria para que el embarazo continúe. El misoprostol provoca contracciones musculares en el útero, lo que causa que el embarazo sea expulsado del útero. Estos medicamentos se utilizan juntos para interrumpir un embarazo temprano. Un embarazo temprano significa que han pasado 70 días (10 semanas) o menos desde que comenzó su último período menstrual.

¿Qué tan bien funcionan?


Cuando se utilizan juntos, estos medicamentos interrumpen el embarazo en aproximadamente 97 de cada 100 personas. Si cree que podría continuar en embarazo después de usar el medicamento, llame a su médico.

¿Cuándo debería comenzar con los anticonceptivos?

Puede volver a quedar en embarazo inmediatamente después de que su embarazo termine. Si no desea quedar en embarazo de nuevo, puede comenzar a usar anticonceptivos tan pronto como siga el **PASO 1**.

¿En qué momento debería llamar a mi médico o recibir atención médica?


Si tiene un sangrado que empapa 2 toallas sanitarias de tamaño regular por hora durante 2 horas consecutivas.



Si presenta una sensación general de enfermedad, debilidad o malestar por más de 24 horas después del **PASO 2**.



Si tiene fiebre de más de 101 °F o de más de 100.4 °F que dure más de 4 horas.



Si tiene poco o ningún sangrado, si no cree que el embarazo haya sido expulsado o si aún presenta síntomas de embarazo 7 días después del **PASO 2**.



Si tiene dolor que no mejora después de tomar medicamentos para el dolor o tiene dolor intenso en el vientre o el abdomen.

Número de teléfono de mi farmacia

Número de teléfono de mi médico