

PASO 1: Mifepristona

Pastilla tomada el _____ a las _____ a.m./p.m.



Trague 1 pastilla cuando esté lista.

PASO 2: Misoprostol

Tome las pastillas el _____ a las _____ a.m./p.m.



Tome estas pastillas entre 24 y 48 horas después del PASO 1.

Ponga 2 pastillas dentro de cada mejilla (4 pastillas en total). Espere 30 minutos para que las pastillas se disuelvan. Luego, haga buches con agua y trague.



¿Qué debería esperar?

- El sangrado y los cólicos serán más intensos que los de su período habitual y comenzarán dentro de unas pocas horas después de seguir el **PASO 2**.
- El sangrado puede comenzar después de seguir el **PASO 1** y antes de seguir el **PASO 2**.
- Puede presentar náuseas, dolor de cabeza, diarrea, mareos, fiebre o escalofríos.
- No tome más pastillas para el dolor de las que le haya recomendado su médico. Puede tomar un medicamento de venta libre para la diarrea, si lo necesita.

¿En qué momento debería llamar a mi médico o recibir atención médica?

- Si tiene un sangrado que empapa 2 toallas sanitarias de tamaño regular por hora durante 2 horas consecutivas.
- Si tiene fiebre de más de 101 °F o de más de 100.4 °F que dure más de 4 horas.
- Si tiene dolor que no mejora después de tomar medicamentos para el dolor o tiene dolor intenso en el vientre o el abdomen.
- Si presenta una sensación general de enfermedad, debilidad o malestar por más de 24 horas después del **PASO 2**.
- Si tiene poco o ningún sangrado, si no cree que el embarazo haya sido expulsado o si aún presenta síntomas de embarazo 7 días después del **PASO 2**.