

Aborto Médico

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONSEJERÍA FARMACÉUTICA



Instrucciones de medicación

- ☐ La **pastilla de mifepristona** debe tomarse en casa cuando esté lista, si no se la ha tomado ya en la clínica médica.
- ☐ Las **pastillas de misoprostol** deben tomarse juntas entre 24 y 48 horas después de haber tomado la mifepristona. Ponga dos pastillas dentro de cada mejilla durante 30 minutos, luego enjuáguese con agua y trague lo que quede.



Expectativas

- ☐ El **sangrado y los cólicos** comenzarán a las pocas horas de haber tomado el misoprostol. Es posible que tenga algo de sangrado a causa de la mifepristona antes de tomar el misoprostol.
- ☐ También podría presentar náuseas, diarrea, fiebre y escalofríos.



Medicamento de venta libre

- ☐ No tome más pastillas para el dolor de las que le haya recomendado su médico.
- ☐ Puede tomar un medicamento de venta libre para la diarrea, si lo necesita.



Cuándo llamar / Número de teléfono

- ☐ **Sangrado que empapa 2 toallas sanitarias de tamaño regular por hora durante 2 horas consecutivas.**
- ☐ Fiebre de más de 101°F o de más de 100.4°F que dure más de 4 horas.
- ☐ Dolor que no alivia con analgésicos o dolor abdominal difuso o intenso.
- ☐ Malestar general por más de 24 horas después de la última dosis de misoprostol.
- ☐ Si tiene un sangrado mínimo o cree que no ha expulsado el embarazo, o si continúa con síntomas de embarazo después de 7 días.
- ☐ Confirmar que la persona paciente tenga **el número de teléfono del proveedor.**

© Birth Control Pharmacist 2024